

Paris, le 23 mai 2023

**Objet : Arrêt de commercialisation Enantone® 3,75 mg flacon et mise à disposition d'Enantone LP 1,88 mg en seringue préremplie au 30 juin 2023**

Madame, Monsieur, Chère consœur, Cher confrère,

Le laboratoire Takeda souhaite vous informer de sa décision d'**arrêt de commercialisation** de la spécialité ENANTONE® LP 3,75 mg poudre et solvant pour suspension injectable (S.C. ou I.M.) à libération prolongée en **FLACON** (CIP 3400937575256) à compter du 30 juin 2023.

Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients dans l'ensemble des indications, le laboratoire Takeda **met à disposition** une nouvelle spécialité ENANTONE® LP 1,88 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (S.C.) à libération prolongée en **SERINGUE PRE-REMPLE** (CIP 3400930233726).

La spécialité ENANTONE LP 3,75 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (S.C ou I.M) à libération prolongée en **SERINGUE PRE-REMPLE** (CIP 3400930122112) sera toujours disponible et commercialisée.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif l'ensemble des formulations disponibles au regard des indications de la spécialité.

**Tableau récapitulatif des spécialités ENANTONE LP disponibles à compter du 30 juin 2023 au regard des indications du médicament**

Indications		ENANTONE®LP 3,75 mg Flacon <b>**Arrêt au 30 juin 2023**</b>	ENANTONE® LP 1,88 mg en seringue préremplie <b>**Commercialisation le 30 juin 2023**</b>	ENANTONE®LP 3,75 mg en seringue préremplie
<b>Cancer de la prostate</b>	Traitement du cancer de la prostate <b>localement avancé ou métastatique.</b>	✓		✓
	Traitement <b>concomitant et adjuvant à la radiothérapie externe</b> dans le cancer de la prostate <b>localement avancé</b> (stade T3-T4 de la classification TNM ou stade C de la classification AUA).	✓		✓
Traitement de la <b>puberté précoce centrale</b> (avant 9 ans chez la fille, avant 10 ans chez le garçon) chez les enfants d'un <u>poids inférieur à 20 kg</u>		✓	✓	
Traitement de la <b>puberté précoce centrale</b> (avant 9 ans chez la fille, avant 10 ans chez le garçon) chez les enfants d'un <u>poids supérieur ou égal à 20 kg</u>		✓		✓
Traitement de l' <b>endométriose à localisation génitale et extragénitale</b> (du stade I à au stade IV). L'expérience clinique relative au traitement de l'endométriose est limitée aux femmes de 18 ans et plus.		✓		✓

Traitement du <b>cancer du sein métastatique hormono-dépendant de la femme pré-ménopausée</b> quand une suppression de la fonction ovarienne est nécessaire.	✓		✓
Traitement <b>préopératoire des fibromes utérins</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• associés à une anémie (avec un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 8 g/dL),</li><li>• dans le cas où une réduction de la taille du fibrome est nécessaire pour faciliter ou modifier la technique opératoire : chirurgie endoscopique, chirurgie transvaginale.</li></ul>	✓		✓

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, notre Service d'Information Médicale se tient à votre disposition au 01 40 67 32 90 et par e-mail : [medinfoEMEA@takeda.com](mailto:medinfoEMEA@takeda.com)

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de notre considération distinguée.

Emmanuelle LESOURD

*Pharmacien Responsable*

