
患者さんの人生を一変させ、大きな価値の創出につながる後期開発プログラムを推進




1. Zasocitinib潰瘍性大腸炎（UC）臨床第2b相試験トップライン結果：12週時点の臨床的寛解率はプラセボ群との差が明確に認められ、検討した2用量のうち1用量で名目上有意なp値が得られた。
有効性に用量依存的な効果は認められなかった。有効性が確認された用量群の臨床的寛解率は、UCを対象に臨床第2相試験で評価された他の経口治療薬候補と同程度であった。安全性はすべての用量群でこれまでの臨床試験と一貫した結果であった。
UCおよびクローン病を対象とした臨床第3相試験の計画策定を進めており、試験を開始するか否かの最終的な判断は、UC-2001試験のさらなるデータ解析およびCD-2001試験の結果を踏まえて行う予定。

2. Deucravacitinibとの直接比較試験、3. Latitude PsO 3003試験 非盲検コホート NCT06550076：Part Aにおける新規組み入れ患者

全てのタイムラインは2026年10月29日時点におけるおおよその予測で、変更される場合があり、また臨床試験・承認申請の結果に左右されます。表中の研究開発マイルストンは包括的なものではありません。
疾患名等の略語用語集は参考資料をご参照下さい。後期開発プログラム：ピボタル試験を実施中または開始が見込まれるプログラム、もしくはプルーフ・オブ・コンセプトを達成したプログラム。

患者さんの人生を一変させ、大きな価値の創出につながる後期開発プログラムを推進



1. Innovent社が追加の適応症における早期開発段階の試験を実施中。
2. TAK-881の欧州における対象疾患：PID、SID、CIDP。日本における対象疾患：PID、SID、CIDP、MMN

全てのタイムラインは2026年10月29日時点におけるおおよその予測で、変更される場合があり、また臨床試験・承認申請の結果に左右されます。表中の研究開発マイルストンは包括的なものではありません。
疾患名等の略語用語集は参考資料をご参照下さい。後期開発プログラム：ピボタル試験を実施中または開始が見込まれるプログラム、もしくはプルーフ・オブ・コンセプトを達成したプログラム。

ライフ・サイクル・マネジメントを通じ、既存ポートフォリオの価値を最大化



1. TAK-755はADAMTS13（遺伝子組換え）の開発コード
2. QDENGAはオーストラリア（2026年4月）、インド（2026年7月）で承認取得

全てのタイムラインは2026年10月29日時点におけるおおよその予測で、変更される場合があり、また臨床試験・承認申請の結果に左右されます。表中の研究開発マイルストンは包括的なものではありません。疾患名等の略語用語集は参考資料をご参照下さい。

略語の用語集

地域に関する略語:
CN: 中国; EU: 欧州; JP: 日本; UK: 英国; US: 米国

1L	first line（1次治療）
2L	second line（2次治療）
3L	third line（3次治療）
AA	anemia-associated（～に伴う貧血）
AATD	α1-antitrypsin deficiency（α1アンチトリプシン欠乏症）
ADAMTS13	a disintegrin-like and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motifs 13（トロンボスポンジン1型モチーフ13を有するディスインテグリンおよびメタロプロテイナーゼ）
ADC	antibody–drug conjugate（抗体薬物複合体）
AE	adverse event（有害事象）
AE	autoimmune encephalitis（自己免疫性脳炎）
AI	artificial intelligence（人工知能）
AMR	antibody-mediated rejection（抗体関連型拒絶）
AT	arcotatug tavatecan
BID	bis in die（1日2回投与）
BTD	breakthrough therapy designation（画期的新薬指定）
CEO	chief executive officer（最高経営責任者）
CI	confidence interval（信頼区間）
CIDP	chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy（慢性炎症性脱髄性多発根神経炎）
CLDN18.2	claudin 18.2
CML	chronic myeloid leukemia（慢性骨髄性白血病）
cORR	confirmed objective response rate（確定客観的奏効率）
CP-CML	chronic-phase chronic myeloid leukemia（慢性期の慢性骨髄性白血病）
CRC	colorectal cancer（大腸がん）
cTTP	congenital thrombotic thrombocytopenic purpura（先天性血栓性血小板減少性紫斑病）
CY	calendar year（暦年）
DOAC	direct oral anti-coagulation（直接経口抗凝固薬）
EADV	European Academy of Dermatology and Venereology（欧州皮膚科学会）
EMA	European Medicines Agency（欧州医薬品庁）
EQ-5D-5L	EuroQol-5 Dimensions 5-levels（自己評価によるQOLの評価指標）
ESMO	European Society for Medical Oncology（欧州臨床腫瘍学会）
Fc	fragment crystallizable（結晶化可能フラグメント）
FDA	U.S. Food & Drug Administration（米国食品医薬品局）
FINI	Functional Impacts of Narcolepsy Instrument（ナルコレプシーによる機能的影響の評価尺度）
FSI	first subject in（最初の患者登録）
FY	fiscal year（年度）
GC	gastric cancer（胃がん）
GI	gastrointestinal（胃腸）
hfPGA	hands and/or feet-specific Physician's Global Assessment（手および/または足の医師総合評価）
HR	hazard ratio（ハザード比）
HS	hidradenitis suppurativa（化膿性汗腺炎）
H2H	head-to-head（直接比較）
IBD	inflammatory bowel disease（炎症性腸疾患）
IgA	immunoglobulin A（免疫グロブリンA）
IgAN	immunoglobulin A nephropathy（IgA腎症）
IgG	immunoglobulin G（免疫グロブリンG）
IH	idiopathic hypersomnia（特発性過眠症）
IL-2/12/17/23	interleukin 2/12/17/23（インターロイキン2/12/17/23）
IND	investigational new drug（治験薬）
ITP	immune thrombocytopenia（免疫性血小板減少症）
IV	intravenous（静脈投与）
JPY	Japanese Yen（日本円）
LCM	lifecycle management（ライフ・サイクル・マネジメント）
MDS	myelodysplastic syndrome（骨髄異形成症候群）
MF	myelofibrosis（骨髄線維症）
MMN	multifocal motor neuropathy（多巣性運動ニューロパチー）
MSS CRC	microsatellite-stable colorectal cancer（マイクロサテライト安定性大腸がん）
NDA	new drug application（新薬承認申請）
NME	new molecular entity（新規候補物質）
NMPA	(China's) National Medical Products Administration（中国国家薬品監督管理局）
NSCLC	non-small cell lung cancer（非小細胞肺がん）
nsqNSCLC	non-squamous non-small cell lung cancer（非扁平上皮非小細胞肺がん）
NSS-CT	Narcolepsy Severity Scale for Clinical Trials（ナルコレプシー重症度スケール）
NT1 or 2	narcolepsy type 1 or 2（ナルコレプシータイプ1または2）
ORR	objective response rate（客観的奏効率）
OS	overall survival（全生存期間）
OX2R	orexin receptor 2（オレキシン2受容体）
PASI	psoriasis area and severity index（乾癬の重症度を表す指標）
PD-1	programmed cell death protein 1（プログラム細胞死タンパク質1）
PDAC	pancreatic ductal adenocarcinoma（浸潤性膵管癌）
PDT	plasma derived therapies（血漿分画製剤）
PDUFA	Prescription Drug User Fee Act（処方薬ユーザーフィー法）
PFS	progression-free survival（無増悪生存期間）
PGA	Physician's Global Assessment（医師総合評価）
Ph1, Ph2, Ph3	phase 1, 2 ,3（臨床第1相、第2相、第3相試験）
PID	primary immunodeficiency（原発性免疫不全）
PMDA	Japan's Pharmaceuticals and Medical Devices Agency（医薬品医療機器総合機構）
POC	proof of concept（概念実証）
PRIME	Priority medicines scheme by EMA（欧州医薬品庁による優先審査スキーム）
PROC	platinum-resistant ovarian cancer（プラチナ製剤抵抗性卵巣がん）
PsA	psoriatic arthritis（乾癬性関節炎）
PsO	psoriasis（乾癬）
PSOC	platinum-sensitive ovarian cancer（プラチナ製剤感受性卵巣がん）
PV	polycythemia vera（真性多血症）
QOL	quality of life（生活の質）
R&D	Research and Development（研究開発）
REM	rapid eye movement（急速眼球運動）
SC	subcutaneous formulation（皮下投与製剤）
SF-36	Short Form-36 Survey（自己報告式の健康状態調査票）
SID	secondary immunodeficiency（続発性免疫不全）
SOC	standard of care（標準治療）
sqNSCLC	squamous non-small cell lung cancer（扁平上皮非小細胞肺がん）
ssPGA	scalp-specific Physician's Global Assessment（頭皮病変の医師総合評価）
TNFα	tumor necrosis factor alpha（腫瘍壊死因子α）
TPC	treatment of physician's choice（医師選択治療）
TRAE	treatment-related adverse event（治療関連有害事象）
TYK2	tyrosine kinase 2（チロシンキナーゼ2）
UC	ulcerative colitis（潰瘍性大腸炎）
UEG(W)	United European Gastroenterology (Week)（欧州消化器病週間）
USD	US dollar（米ドル）
wk(s)	week(s)（週）
WW	worldwide（全世界）